


疾病観察カード

総合判断 A B C

外見	状態	歩行可能・不能(仰・側・腹・坐・その他)	虚脱
	顔貌	顔色	正常 黄・紅潮 土気色 蒼白・チアノーゼ
		表情	正常 興奮・不安・苦悶 無表情・うつろ
	嘔吐・失禁	なし	嘔気・嘔吐・吐血・喀血 失禁(大・小)
	皮膚・体温等	正常	乾燥・発熱・湿潤・発汗・浮腫 冷汗・冷感
眼瞼結膜 爪床 四肢末梢	正常	蒼白・チアノーゼ	

意識	清明	1 2 3 10 20 30 100 200 300	A自発性喪失・I便尿失禁・R不穩状態 意識障害進行
	呼吸	性状	正常 浅・深・喘鳴 異常(呼吸) 胸部挙上不十分 感ぜず
呼吸	数() 回/分	16~19 回/分	10~15 回/分 20~29 回/分 10回/分未満 30回/分以上
	呼吸音	正常	左右差(なし あり) 乾性ラ音・湿性ラ音
脈拍	緊張度	正常	強 弱 微弱
	リズム	整	不整()
	数() 回/分	50~100 回/分	101~119 回/分 50回/分未満 120回/分以上 総頸触れず
	左右差	なし	あり()
血圧	測定値	/	左右差(なし あり)
	収縮期 血圧	90~140 mmHg	141~199mmHg 90mmHg未満 測定不能 200mmHg以上
SpO ₂	93%~	90~92%	90%未満()%
瞳孔	大きさ	正常	縮小(両側)・不同(左>・右>) 散大
	反射	正常	にぶい なし
	偏視	なし	右・左・上・下・右斜め・左斜め・共同偏視



- ※1 赤枠の項目が1つでもあれば、重症と判断する
- ※2 青枠の項目は2つ以上で重症と判断する
- ※3 緑色の項目は総合的に重症度を判断する

主訴・局所状態

痙攣等	なし	ふるえ・弛緩・痙攣 { 局所代 }	全身強直
		しびれ・悪寒・めまい・耳鳴り・動悸	脱力感・胸内苦悶
麻痺	なし	言語・知覚	運動 { 上肢・下肢・片(右・左) } 上半身・下半身・全麻痺
			除脳硬直・除皮質硬直
痛み	なし	頭・頸・胸・腹・腰・背・上肢・下肢・(左・右)	
	なし	鈍痛・激痛	限局・放散 間歇・持続
呼気臭	なし	アルコール様臭・ガス臭・薬物臭等	
その他	なし	下痢・下血・生理・泥酔	

既往症	なし	心疾・脳血・高血・消化・泌尿・糖尿病・その他
-----	----	------------------------

重症と判断すべき症状

意識障害	進行性の意識障害 痙攣重積(30分以上) 低酸素環境 高温/低温環境 高度脱水 収縮期血圧200mmHg以上 項部硬直 頭痛、嘔吐
------	--

消化管出血	肝硬変 腹壁緊張 腹膜刺激症状 高度脱水 高度貧血症 頻回の嘔吐
-------	---

呼吸困難	チアノーゼ 起坐呼吸 著明な喘鳴を伴う努力性呼吸 胸痛 喀血(概ね 100cc以上) 著明な浮腫 呼吸音の左右差(呼吸音の消失又は減弱がある場合) 広範囲湿性う音・乾性う音(肺野の約50%以上の範囲) 喘息重積発作(24時間以上持続している場合) 腎不全の人工透析治療中 心筋梗塞、弁膜症、心筋症
------	--

胸痛	チアノーゼ 20分以上の胸部痛、絞扼痛 背部の激痛 心電図上の不整脈(頻拍性心房細動・粗動、上室性頻拍症、高度房室ブロック) 多源性、連発PVC、RonT 収縮期血圧 200mmHg以上 血圧の左右差(左右の上肢の血圧差がおおむね10mmHg以上の場合) 呼吸音の左右差
----	--

妊娠初期から産褥期	意識障害(JCS 1以上) 痙攣発作 脳血管障害(疑い含む) 大量の不正出血 異常出産(前置胎盤、臍帯脱出、骨盤位) 胸部の激痛 腹部の激痛
-----------	--

腹痛	腹壁緊張または圧痛 腹膜刺激症状(筋性防御、反跳痛) 高度脱水 高度貧血 頻回の嘔吐 グル音消失 有響性金属性グル音 人工的妊娠中絶後 吐血、下血(推定出血量が1,000ml以上、又は多量の新鮮血がある場合) 腹部の異常膨隆
----	---

外傷観察カード

総合判断

A

B

C

外見	状態	歩行可能・不能(仰・側・腹・坐・その他)		虚脱	
	顔貌	顔色	正常	黄・紅潮	土気色・蒼白・チアノーゼ
		表情	正常	興奮・不安・苦悶	無表情・うつろ
	嘔吐・失禁	なし	嘔気・嘔吐・吐血・喀血	失禁(大・小)	
	皮膚・体温等	正常	乾燥・発熱・湿潤・発汗・浮腫	冷汗・冷感	
眼瞼結膜 爪床 四肢末梢	正常	蒼白・チアノーゼ			

バイタルサイン	意識		清明	1 2 3 10	20 30 100 200 300	A 自発性喪失・I 便尿失禁・R 不穏状態	意識障害進行	
	呼吸	性状	正常	浅・深・喘鳴・	異常(呼吸)	胸部挙上不十分	感ぜず	
		回数 (回/分)	成人	16~19	20~29	10~15	10未満または30以上	
			6歳以上15歳未満	15~30		15未満または31以上		
			3歳以上6歳未満	20~30		20未満または31以上		
			1歳以上3歳未満	20~40		20未満または41以上		
	1歳未満	30~60		30未満または61以上				
	呼吸音	正常	左右差(なし・あり)	乾性ラ音・湿性ラ音	狭窄音			
	脈拍	緊張度	正常	強・弱	左右差(なし・あり)	微弱		
		リズム	整	不整()	総頸触れず			
回数 (回/分)		成人	50~100	101~109	50未満または120以上			
		6歳以上15歳未満	60~110		60未満または111以上			
		3歳以上6歳未満	70~110		70未満または111以上			
	1歳以上3歳未満	80~130		80未満または131以上				
1歳未満	80~160		80未満または161以上					
血圧	収縮期血圧	90~140 mmHg	141~199 mmHg	90mmHg未満	200mmHg以上	測定不能		
	SpO ₂	93%~	90~92%	90%未満()%				
瞳孔	大きさ	正常	縮小(両側)・不同(左>・右>)	散大				
	反射	正常	にぶい	なし				
	偏視	なし	右・左・上・下・右斜め・左斜め・共同偏視					

左() 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● mm
右()

※1 赤枠の項目が1つでもあれば、重症と判断する

※2 緑色の項目は総合的に重症度を判断する

主訴
局所
創傷等
骨折

痙攣等	なし	ふるえ・弛緩・痙攣	{ 局所代間 }	全身強直
麻痺	なし	言語・知覚	運動 { 上肢・下肢・片(左・右) } { 上半身・下半身・全麻痺 }	除脳硬直・除皮質硬直
部位		頭・顔・眼・鼻・口・耳・頸・肩・胸・腹・腰・背・臀・陰前額 前胸部 側頭部 後頭部	上腹部 上肢左(肩・上腕・肘・前腕・手) 右(肩・上腕・肘・前腕・手) 下腹部 下肢左(鼠径・大腿・膝・下腿・足) 右(鼠径・大腿・膝・下腿・足)	
痛み	なし	鈍痛・激痛	限局・放散	間歇・持続
出血	なし	止血・持続	皮下血腫 末梢(静脈・動脈)	出血量少・中・多 約() 毛細血管 髓液(耳・鼻)漏 耳・鼻出血 中枢 (動脈・静脈)
創傷等	なし	擦過傷(創)・打撲・挫傷(創) 咬創・切創・割創・挫滅創		刺創・杵創 切断・轢断
骨折	なし	捻挫・腫脹・脱臼・変形・非開放	鎖骨・肋骨	陥没・開放・動揺・轢音 頸損・脊損(胸・腰)・胸壁運動の左右差 胸郭動揺・骨盤・両側大腿骨・顔面骨
既往症	なし	心疾・脳血・高血・消化・泌尿・その他		

受傷機転(重症)	頸部刺創 胸腹部刺創、銃創 高所墜落(約5m以上の場合) 機械器具に巻き込まれた 頭、頸、体幹部が挟まれた 車から放り出された 同乗者の死亡 救出に20分以上要した	車の横転 車が高度に損傷している 車にひかれた 5m以上跳ね飛ばされた 受傷機転(転倒したバイクと運転者の距離、大。自動車が歩行者、自転車に衝突等)から重症と疑える場合
----------	---	--


記事欄
薬剤使用歴：
最終飲食時刻：

乳児小児観察カード

総合判断 A B C

外見	状態	元気	不機嫌・強い泣声	弱い泣声・ぐったり	
	顔貌	顔色	正常	紅潮	黄・蒼白・チアノーゼ
		表情	正常	興奮・不安	苦悶
	嘔吐	なし	嘔気・嘔吐	頻回の嘔吐	
皮膚・体温 脱水状態	正常	発熱・湿潤・発汗・浮腫	乾燥	冷感	冷汗
		無尿・皮膚弾力無・高度黄疸・高度紫斑			

バイタルサイン	意識	清明	1	2	3	10	20	30	100	200	300	
		自発性喪失・便尿失禁・不穏状態 障害(後睡眠・ぼんやり・障害持続・傾眠)							意識障害進行			
	呼吸	性状	正常	浅・深・喘鳴		異常(呼吸)						
		回数	1歳未満	30~60回/分		30回/分未満 または 61回/分以上						
			1歳以上 3歳未満	20~40回/分		20回/分未満 または 41回/分以上						
			3歳以上 6歳未満	20~30回/分		20回/分未満 または 31回/分以上						
			6歳以上 15歳未満	15~30回/分		15回/分未満 または 31回/分以上						
	呼吸音	正常	左右差(なし)		あり(乾性ラ音・湿性ラ音)							
	緊張度	正常	強弱		微弱							
	リズム	整		不整								
	脈拍	回数	1歳未満	80~160回/分		80回/分未満 または 161回/分以上						
			1歳以上 3歳未満	80~130回/分		80回/分未満 または 131回/分以上						
			3歳以上 6歳未満	70~110回/分		70回/分未満 または 111回/分以上						
			6歳以上 15歳未満	60~110回/分		60回/分未満 または 111回/分以上						
	左右差	なし		あり(なし)								
瞳孔	大きさ	正常	両側縮瞳		不同(左>・右>) 散大							
	反射	正常	にぶい									
	偏視	なし	右・左・上・下・右斜め・左斜め 共同偏視									



- ※1 赤枠の項目が1つでもあれば、重症または緊急度が高いと判断する
- ※2 青枠の項目は2つ以上で重症と判断する
- ※3 緑色の項目は総合的に重症度を判断する

バイタルサイン

収縮期 血圧	1歳未満	70~95 mmHg	収縮期 70mmHg 未満	測定 不能
	1歳以上3歳未満	80~110 mmHg		
	3歳以上6歳未満	80~110 mmHg		
	6歳以上15歳未満	90~120 mmHg		
SpO ₂	90%未満	酸素投与下(10ℓ/分)で90%未満		
体温	() 度	36.0度未満 41.0度以上		

下痢等	なし	便秘・下痢	粘血便・黒色便・白色便		
咳	なし	あり			
麻痺	なし	知覚	運動	上肢・下肢	片(右・左)
		除脳硬直・除皮質硬直		右半身・左半身・全麻痺	
痙攣	状態	なし	局所	全身	継続
	経過	なし	既往 (あり・なし)		
痛み	部位	なし	頭・頸・胸・腹・腰・背・上肢・下肢・臀部・陰部		
	状態	なし	間歇	持続	

緊急度判断項目

- 呼びかけに開眼しない
- 現場到着時に全身性痙攣が持続
- 上気道閉塞・窒息またはその切迫状態
- アナフィラキシーショックが疑われる
- 循環不全(次の項目を全て満たすもの)
 - 動脈(総頸、上腕、大腿)で脈拍が弱い
 - 頻脈:180回/分以上
 - 毛細血管再充満時間:2秒以上
- 呼吸停止またはその切迫状態
- 意識障害を伴う呼吸障害
- 徐脈:60回/分未満(6歳未満)

アプガー	心拍数	呼吸数	筋緊張	刺激感覚	皮膚色	総計	
点	0	触れず	感ぜず	弛緩	なし	蒼白 チアノーゼ	0~7 不良
数	1	100未満	遅不整	曲げあり	しかめる	四肢 チアノーゼ	8~10 良
	2	100以上	整	活発	くしゃみ	全身淡紅	
小計							

既往症	身長	cm	体重	kg
-----	----	----	----	----

記事欄

中毒観察カード

総合判断 A B C

外見	状態	歩行可能・不能（仰・側・腹・坐・その他）		虚脱		
	顔貌	顔色	正常	鮮紅色	土気色	蒼白・チアノーゼ
		表情	正常	興奮・不安・苦悶	無表情・うつろ	
	口腔内状態	正常	発赤・びらん・着色（色）			
	嘔吐・失禁	なし	嘔気・嘔吐・吐血・喀血		失禁（大・小）	
皮膚・体温等	正常	鮮紅色・乾燥・湿潤・発汗		冷汗・冷感		

バイタルサイン	意識		清明	1	2	3	10	20	30	100	200	300	
			A自発性喪失・I便尿失禁・R不穏状態							意識障害進行			
	呼吸	性状	正常	浅・深・喘鳴		異常（呼吸）							
				胸部挙上不十分				感ぜず					
		数（ ） 回／分	16～19 回／分	10～15 回／分			20～29 回／分			10回／分未満			
	呼吸音	正常	左右差（なしあり）				乾性ラ音・湿性ラ音						
	脈拍	緊張度	正常	強弱		微弱							
		リズム	整	不整（ ）									
		数（ ） 回／分	50～100 回／分	101～119 回／分		50回／分 未満		120回／分 以上					総頸 触れず
		左右差	なし	あり（ ）									
	血圧	測定値	/	左右差（なしあり）									
		収縮期 血圧	140～90 mmHg	141～199mmHg				90mmHg未満		測定不能 200mmHg以上			
	SpO ₂	93～%	90～92%		90%未満（ % ）								
	瞳孔	大きさ	正常	縮小（両側）・不同（左＞・右＞）									散大
		反射	正常	にぶい				なし					
偏視		なし	右・左・上・下・右斜め・左斜め・共同偏視										

左（ ） 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● mm
右（ ）

- ※1 赤枠の項目が1つでもあれば、重症と判断する
- ※2 青枠の項目は2つ以上で重症と判断する
- ※3 緑色の項目は総合的に重症度を判断する

主訴・局所状態

異常臭	なし	<ul style="list-style-type: none"> ・ 靴墨臭(シアン化合物) ・ 塩素臭(漂白剤) ・ アルコール臭 ・ ニンニク臭(有機リン) ・ クレゾール臭(消毒剤) ・ アーモンド臭(青酸化物)
痙攣等	なし	ふるえ・弛緩・痙攣 {局所代 全身強直} しびれ・悪寒・めまい・耳鳴り・動悸・脱力感・胸内苦悶
麻痺	なし	言語・知覚 運動 {上肢・下肢・片(右・左) 上半身・下半身・全麻痺} 除脳硬直・除皮質硬直
痛み	なし	頭・頸・胸・腹・腰・背・上肢・下肢・(左・右)
既往症	なし	心疾・脳血・高血・消化・泌尿・その他

中毒原因物質(疑)

医薬品
 ・意識レベル(JCS)20以上
 ・おおむね50錠以上の服用
 ・有害作用の特に強い医薬品の服用(アセトアミノフェン、三環系抗うつ薬等)
 ただし、少量の服用を除く
 ・服用量が不明
農薬(パラコート、有機リン等の薬剤)
工業用品(強酸、強アルカリ、石油製品、青酸化合物等)
覚醒剤及び麻薬
有毒ガス(一酸化炭素、液化石油ガス、硫化水素、窒素酸化物等)
毒性のある食物
 何を飲んだか不明のもの

記事欄

熱傷観察カード

総合判断 A B C

外見	状態	歩行可能・不能(仰・側・腹・坐・その他)・ 虚脱		
	顔貌	顔色	正常	鮮紅色 土気色 蒼白・チアノーゼ
		表情	正常	興奮・不安・苦悶 無表情・うつろ
	嘔吐・失禁	なし	嘔気・嘔吐・吐血・喀血	失禁(大・小)
	皮膚・体温等	正常	鮮紅色 乾燥・湿潤 発汗	冷汗 冷感

バイタルサイン	意識		清明	1	2	3	10	20	30	100	200	300			
			A自発性喪失・I便尿失禁・R不穏状態								意識障害進行				
	呼吸	性状	正常	浅・深・喘鳴・ 異常(呼吸)					胸部挙上不十分 感ぜず						
		数() 回/分	16~19 回/分	10~15 回/分			20~29 回/分			10回/分未満 30回/分以上					
		呼吸音	正常	左右差(なし・あり)				乾性ラ音・湿性ラ音							
	脈拍	緊張度	正常	強			弱			微弱					
		リズム	整	不整()										総頸 触れず	
		数() 回/分	50~100 回/分	101~119 回/分		50回/分 未満		120回/分 以上							
		左右差	なし	あり()											
	血圧	測定値	/	左右差(なし・あり)				測定不能							
		収縮期 血圧	140~90 mmHg	141~199mmHg				90mmHg未満 200mmHg以上							
		SpO ₂	93%~	90~92%				90%未満()%							
	瞳孔	大きさ	正常	縮小(両側)・不同(左>・右>)								散大			
		反射	正常	にぶい						なし					
		偏視	なし	右・左・上・下・右斜め・左斜め・共同偏視											

左() 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● mm
右()

- ※1 **赤枠**の項目が1つでもあれば、重症と判断する
- ※2 **青枠**の項目は2つ以上で重症と判断する
- ※3 **緑色**の項目は総合的に重症度を判断する

主訴・局所状態

痙攣等	なし	ふるえ・弛緩・痙攣	局所代 間代	全身強直
		しびれ・悪寒・めまい・耳鳴り・動悸		脱力感・胸内苦悶
麻痺	なし	言語・知覚	運動	{ 上肢・下肢・片(右・左) 上半身・下半身・全麻痺 }
				除脳硬直・除皮質硬直
痛み	なし	頭・頸・胸・腹・腰・背・上肢・下肢・臀・陰		鈍痛・激痛

原因	高熱固体・高熱液体・蒸気・化学薬品・電撃・火災・爆発									
部位	頭・顔	胸部	腹部	陰部	背部	上肢		下肢		
面積%	成人	9	9	9	1	18	左9	右9	左18	右18
	小児 幼児 乳児	20	20			20	左10	右10	左10	右10
深度%	I度									
	II度									
	III度									
深度範囲	I・II度9%以下		II度10~29%			II度30%以上		気道熱傷		
	III度 1%以下		III度 2~ 9%			III度10%以上				

受傷の程度

- ・ II度熱傷 30%以上
- ・ III度熱傷 10%以上
- ・ 化学損傷 10%以上
- ・ 電撃傷
- ・ 気道熱傷
- ・ 陰部、関節部の熱傷(II度以上)
- ・ 他の外傷の合併
- ・ II度熱傷10%以上あるいはIII度熱傷5%以上(8歳未満70歳以上)

既往症 なし 心疾・脳血・高血・消化・泌尿・その他

記事欄