

図表 2-4-47 加害事故の事故発症時動作別搬送人員

事故発症時動作	年齢層 (歳)											合計		
	0-2	3-5	6-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-69	70-74		75-	
行動・物体作用	外力作用・接触のない動作	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	1	2	9
	転倒	-	-	7	7	22	38	29	55	19	14	18	41	250
	転落・滑落	-	-	-	-	5	6	8	4	3	1	1	3	31
	墜落・飛び降り	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	挟まれ・巻き込まれ・ねじられ	-	-	2	1	6	4	11	9	2	2	-	-	37
	躓かれ・踏まれ	-	-	1	3	6	7	6	4	2	-	-	-	29
	衝突・ぶつかり	-	2	13	8	64	48	68	61	18	18	13	30	343
	殴打・蹴られ	5	12	78	148	768	640	630	492	111	96	91	165	3,236
	ひきずられ・引っ張られ	1	-	4	4	27	26	33	28	3	5	5	7	143
	噛まれ・引っ掻き	-	-	4	1	20	16	13	11	7	3	2	8	85
	埋没・圧迫・押され	2	-	3	3	16	31	31	36	14	11	9	16	172
	飛来物・落下物	-	1	5	4	10	8	18	12	2	3	4	11	78
	その他行動・作用	-	-	7	2	22	14	22	16	1	3	5	7	99
	不明	-	-	3	2	11	13	8	9	4	3	3	6	62
危険物接触作用・環境暴露	刃物・鋭利物	-	1	5	10	35	23	29	23	4	9	5	5	149
	鈍器物	-	1	3	-	2	6	7	3	2	2	1	2	29
	銃器・武器	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	高熱固体・燃焼物	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
	高熱液体・燃焼物	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	6
	有毒液体・燃焼物	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3
	有毒気体・燃焼物	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	その他危険物	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	4
窒息・誤飲・異物	縊首・絞首	1	-	1	5	4	3	2	4	-	-	1	1	22
	窒息・誤飲 (気道)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	異物 (感覚器官)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
薬物服用・吸入・中毒	その他医薬品	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	消毒剤・洗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	有機溶剤	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	日常生活用品	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	その他薬物・中毒	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	6
その他	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	6	